

Procedura przygotowania Pacjentki do diagnostyki molekularnej w kierunku infekcji HPV (wymaz z szyjki macicy) metodą real-time PCR

Przed przystąpieniem do pobrania materiału (wymaz z szyjki macicy) należy upewnić się czy Pacjentka jest prawidłowo przygotowana do procedury.

Przygotowanie Pacjentki do badania

1. Przez okres **48 godz.** przed pobraniem wymazu należy zrezygnować ze współżycia płciowego.
2. Przez okres **48 godz.** przed pobraniem materiału nie należy stosować żadnych leków dopochwowych (w tym plemnikobójczych), maści zewnętrznych i preparatów nawilżających oraz wykonywać irygacji.
3. W dniu badania należy ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne w okolicy narządów płciowych (nie stosować mydeł i środków do higieny intymnej).
4. Wymazu **nie należy** pobierać w okresie krwawienia miesięczkowego (najwcześniej 2 dni po jego ustaniu) i w okresie owulacyjnym.
5. **Po leczeniu antybiotykami** należy zachować minimum **7 dni przerwy** od ostatniej dawki leku.
6. Należy zachować **1 dzień przerwy** po badaniu ginekologicznym oraz USG dopochwowym.